



23 mai 2023
n° 11

MERCREDI 24	JEUDI 25	VENDREDI 26	SAMEDI 27	DIMANCHE 28	LUNDI 29	MARDI 30
14° / 21°	13° / 19°	9° / 23°	12° / 25°	13° / 26°	13° / 24°	13° / 24°
2 à 22 mm	10 à 13 mm	-	-	1 à 9 mm	4 mm	3 à 6 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Précipitations		Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			ensilage-enrubanné prairies précoces	Foin de qualité prairies précoces	Foin fibreux prairie précoce
	7 derniers jours	30 derniers jours	2023	2022	année moy			
23-mai-23						850 °j	1100 °j	1200 °j
Ossun	1 mm	111 mm	1103°	1184	1102		22-mai	29-mai
Vic-en-Bigorre	1 mm	101 mm	1156°	1247	1181	2-mai	19-mai	25-mai
Campistrous	6 mm	153 mm	1018°	1102	1004	9-mai	28-mai	4-juin
Lomné	8 mm	155 mm	1093°	1176	1078	5-mai	23-mai	30-mai
Adast	8 mm	109 mm	1018°	1183	1003	10-mai	28-mai	3-juin
Castelnau-Magnoac	2 mm	118 mm	1132°	1164	1143	3-mai	21-mai	26-mai

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
1159°jour	1125°jour	1076°jour	1042°jour	1016°jour	948°jour	879°jour	854°jour	829°jour

Repères intervention

	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire
Prairie temporaire	500 °Cjour	800 °Cjour	1000 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °Cjour	900 °Cjour	1100 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	800 °Cjour	1000 °Cjour	1200 °Cjour


A faire cette semaine

- Les chantiers de récoltes sont perturbés par des pluies quasi journalières alors qu'on a atteint le stade optimal de fauche sur les secteurs de basse altitude.
- N'hésitez pas à faucher dès que le temps le permet quitte à privilégier l'enrubannage si le créneau est trop court.
- Avec l'épiaison rapide des graminées, les refus sont parfois importants au pâturage. N'hésitez pas à broyer dès la sortie des animaux afin que l'herbe redémarre rapidement. Vous pouvez également pratiquer le « toping » en fauchant avant que le troupeau n'entre sur la parcelle. L'herbe haute sera mieux consommée et la parcelle sera propre pour la pousse suivante. Attention toutefois, ceci est déconseillé s'il y a trop de quantités et doit rester exceptionnel au vu du cout du travail.



Date de fauche et qualité des fourrages

- La précocité d'une fauche influe pour une part importante sur la qualité du fourrage récolté, bien plus que les espèces présentes.
- En effet, au fur et à mesure que l'herbe « mûrit », sa valeur alimentaire (énergie et azote) diminue :



- Ramené à l'hectare, il y a un maximum de valeur alimentaire au moment de l'épiaison. Attention, ce maximum n'intervient pas au même moment selon le type de prairie.
- On note également que la valeur alimentaire récoltée à l'hectare diminue rapidement surtout sur les prairies précoces et fertiles.
- L'apport d'une fertilisation azotée rend les prairies encore d'avantage précoces. Dans ce cas il faut donc être encore plus vigilant sur la date de fauche car si on intervient trop tard, la valeur alimentaire chute très rapidement et l'effet de l'apport minéral est perdu.

Faucher tôt c'est privilégier un foin de qualité pour une meilleure production de vos animaux (lait et viande).

Faucher tard c'est obtenir un fourrage grossier, bon pour la rumination mais qui doit être complétement d'avantage (coût important).